

## VI

### Formes ou stations nouvelles de *Potentilles*

recoltées par le

Chanoine **Maurice BESSE**

du Grand-S<sup>t</sup>-Bernard

N. B. Les *Potentilles* suivantes ont été examinées et déterminées par M. Siegfried, de Winterthur.

*Potentilla pallidioïdes*, M. Besse (1892).

Syn.: *P. incrassata* Zimm. var *Valesiaca* L. Favrat × *P. pallida* Lehm. sec. Siegf. — « *P. caulibus e rhizomate crasso ascendentibus rubescentibus incrassatis pubescentibus, foliis 5 natis, supra villosiusculis pilis adpressis, subtus dense cano-tomentoso villosis, petiolis tomentosis pilis glanduliferis intermixtis, foliolis obovatis profunde serratis, dentibus lanceolatis acutis utrinque 4-6, folio intermedio interdum 2-3 partito, axillis inflorescentiæ tomentosis pilisque glanduliferis, petalis calycem fere duplo superantibus, dimidio fere pollinis inertis.*

*Epicarpium* sec. Clarissim Siegfried rugoso-reticulatum. »

Sic Rob. Keller.

Tassonières, Fully. Mai-Juin.

*Potentilla Besseana*, Sigfried. (1892).

Syn.: *P. argentea*, L. non auct × *P. incrassata* Zim. var *Valesiaca*, L. Favrat. « *P. caulibus erectis incrassatis rubescentibus, foliis 5 natis, inferioribus longe petiolatis, supra glabriusculis vel villosiusculis pilis longis adpressis, subtus dense cano-tomentoso villosis pilisque rigidis, foliolis obovatis, cuneatis, basi integerrimis, incisis, lobis lanceolatis vel lineari lanceolatis, partim inciso-serratis margine revolutis, rarissime fere planis, petalis paulo longioribus rotundis leviter emarginatis.*

Observ.: Pollen fere perfectum!

Secundum Keller pl. forma vel hybrida *P. argenteæ* est. »

Sic R. Keller.

Tassonières, Mazembroz, Fully. Mai-Juin.

*Potentilla Murithii*, M. Besse, (1893).

Syn.: *P. superalpicola*, De la Soie  $\times$  *P. Gaudini*, Gremli sec. Siegf. « Caules numerosi e rhizomate lignoso, partim pubescentes, pilis puberulis villosiusculi intermixtis pilis longis rigidis adpressis erecto patentibus. Folia 5-natis petioli pubescentia æquali; pubescentior caulis. Foliola subtus cano-tomentoso villosa pilis longis præsertim nervis adpressis, supra pilis adpressis, margine ciliata, obovata, inciso-denticulata, dentibus utrinque 2-4 versus basin cuneata. Pedunculi tenues apice passim curvati. Petalæ fere duplo longiores sepalis. Dimidium pollinis, vel plus inerte. »

Sic Rob. Keller.

Sembrancher, sur la route de Volléges. Mai-Juin.

*Potentilla Murithii*, M. Besse, (1893).

Syn.: *Pot. super-Gaudini* Gremli  $\times$  *alpicola* De la Soie. « *Potentilla* caulibus ascendentibus pilis longis horizontaliter distantibus brevibusque villosiusculis; foliis 5-natis longe petiolatis, petiolis pedicellisque copiose pilis horizontaliter distantibus, huic inde pilis stellatis, foliolis obovatis versus basin cuneatis, integris, superne utrinque 3-4 inciso-serratis, planis, subtus et supra pilis stellatis, pedicellis rare pilis glanduliferis, margine calicis pilis longis simplicibus et pilis stellatis. Dimidium pollinis vel plus inerte. »

Sic Rob. Keller, in Zurich.

Mont-Clou, Bovernier. Mai.

*Potentilla incrassata* Zimm. var. *Valesiaca* L. Favrat.

« *Potentilla* rhizomate incrassato, caulibus ascendentibus puberulis, foliis inferioribus longe petiolatis 5 natis, petiolo puberulo, foliis cuneatis margine revolutis inæqualiter inciso-serratis vel lobatis, dentibus utrinque 5-6, supra pilis longis sericeis adpressis, infra tomentosus niveis pilis puberulis rigidisque intermixtis nervis adpressis, sepalis

longe pilosis tomentosis pilisque puberulis, petalis parvis aurantiacis. »

Sic R. Keller, in Zurich.

Chemin qui conduit de Fully à Tassonières; Branson; vignes de Saxon près Ecône. Avril-Juin.

*Potentilla Kernerii*, Borbas var. *Valesiaca* Favrat.

Syn.: *P. superargentea*, L. non auct  $\times$  *P. pablida* Lehm.  
« *Potentilla* caulibus ascendentibus versus basin rubescentibus pilis crispis rigidisque, foliis 5-7 natis, supra pilis adpressis, subtus dense cano-tomentoso villosis, foliolis obovatis inciso-serratis dentibus lineari-lanceolatis, utrinque 6-7, margine revolutis, petalis parvis paulo longioribus calyce, pallidis, dimidio fere pollinis inerti.

*Epicarpium* sec. Cl. Siegfried rugoso-reticulatum. »

Sic Rob. Keller.

Branson, Tassonières, sur Fully; Bovernier vers les vignes. Avril-Juin.

*Potentilla tenuiloba*, Jord.

Tassonières, Bovernier, Ecône, Isérables, Mayens de Riddes, Saxon. Mai-Juillet.

*Potentilla Cornazi*, R. Buser.

Syn : *P. pseudo-argentea* Blochi, var. *Cornazi* Siegfried.  
Mayens de Riddes. Juin-Juillet.

*Potentilla pallida*, Lehm.

Branson, Tassonières, Bovernier. Juin-Juillet.

*Potentilla parviflora*, Gaud.

Mayens de Riddes où elle est très répandue. Juin-Juillet.

*Potentilla monticola*, Zimmeter.

Schalberg, Simplon. Mai-Juin.

*Potentilla Tirolensis*, Zimmeter.

Schalberg, Algabi. Simplon; mayens de Riddes; mayens de Leytron et de Chamoson. Mai-Juillet.

*Potentilla Trefferi*, Siegfried.

Syn.: *P. supervillosa* Crantz non auch. al.  $\times$  *P. aurea* L. non auct.

Sous le Kaltwassergletscher, Simplon. Juin-Août.

*Potentilla Huteri*, Siegfried.

Syn.: *P. aurea* L. non auct.  $\times$  *P. verna* L. non auct.  
Simplon; Grands-Plans, Bagnes; Chamosintze sur Chamoson. Juin-Juillet.

*Potentilla Peyritschii*, Zimm.

Syn.: *P. supergrandiflora* L. non auct.  $\times$  *P. aurea* L. non auct.

Grands-Plans, Bagnes. Juin-Juillet.

*Potentilla aurea* L. non auct. var. *alpina* Willh. Lacs de Ferrex. Juillet-Août.

*Potentilla subnivalis* Brügger = *P. aurea*  $\times$  *minima*.  
Juillet-Août.

---